

# WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO MSWiA DLA POLICJI

w sprawie postępowania funkcjonariuszy mających kontakt z osobami  
podejrzanymi o zakażenie/ zakażonymi nowym typem koronawirusa 2019-nCoV

## WIADOMOŚCI OGÓLNE

### Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV

Koronawirusy to rodzina wirusów, które powodują choroby układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i zwierząt.

Czasami koronawirusy występujące u zwierząt mogą zmutować i infekować ludzi, a następnie rozprzestrzeniać się między ludźmi, tak jak obserwowano to w przypadku zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS). Koronawirus 2019-nCoV jest siódmym znanym gatunkiem z rodziny koronawirusów powodującym zachorowania wśród ludzi. Śmiertelność wśród osób zakażonych 2019-nCoV kształtuje się na poziomie około 2%.

### Przebieg zakażenia koronawirusem 2019-nCoV

Do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.

Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Niewykluczone, że może ono nadal być aktywne i przyczyniać się do kolejnych zakażeń u ludzi. Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do 14 dni.

Koronawirus 2019-nCoV wykazuje wrażliwość na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (np. preparaty na bazie alkoholu) oraz inne preparaty dezynfekcyjne o działaniu wirusobójczym.

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w dniu 30.01.2020r. ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym.

## PROFILAKTYKA

1. Obecnie nie ma szczepionki przeciwko chorobie wywołanej koronawirusem 2019-nCoV.
2. Z uwagi na występowanie w Polsce wzmożonej liczby zachorowań wywołanych wirusem grypy sezonowej, w celu uniknięcia jednoczesnego zakażenia koronawirusem 2019-nCoV i wirusem grypy, rekomendowane jest szczepienie przeciwko grypie. Jednoczesne zakażenie organizmu wirusem grypy i koronawirusem 2019-nCoV zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby i wystąpienia ciężkich powikłań.

3. W celu zapobiegania infekcji dróg oddechowych o etiologii wirusowej należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, tj:
- często myć ręce wodą i mydłem,
  - dezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu,
  - unikać dotykania nieumytą ręką twarzy (ust, nosa, oczu),
  - podczas kichania i kaszlu zakrywać usta/nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazowego użytku, którą należy każdorazowo wyrzucić, a następnie umyć ręce,
  - w miarę możliwości zachowywać bezpieczną odległość od drugiego człowieka (ok. 1m),
  - szczególnie unikać kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną,
  - funkcjonariusze oraz pracownicy z objawami infekcji dróg oddechowych nie powinni przebywać w pracy.

### **WSTĘPNA KLASYFIKACJA PRZYPADKÓW 2019-nCoV DLA CELÓW DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO**

#### **Przypadek podejrzany:**

Przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane wirusem 2019-nCoV charakteryzują się:

- objawami ostrego zakażenia dróg oddechowych (co najmniej jeden z następujących objawów: kaszel, ból gardła, duszność, temperatura  $\geq 38$  0C)

**oraz**

- na 14 dni przed wystąpieniem objawów wystąpiło przynajmniej jedno z następujących kryteriów epidemiologicznych:

- bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia 2019-nCoV;

**lub**

- pobyt na terenie zagrożonym (potwierdzone obecnie występowanie w populacji wirusa 2019-nCoV);

**lub**

- praca w zakładzie opieki zdrowotnej (lub pobyt w takim zakładzie), w którym leczono pacjentów zakażonych wirusem 2019-nCoV.

#### **Bliski kontakt jest definiowany jako:**

- ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV,
- przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV.

## SYTUACJE WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI

- Zatrzymanie lub legitymowanie osoby z widocznymi objawami chorobowymi ze strony dróg oddechowych.
- Czynności związane z przeszukiwaniem obiektu, w którym przebywa lub mogła przebywać osoba chora/ podejrzana o zachorowanie.
- Rozwinięcie się u zatrzymanego lub składającego zeznania objawów choroby.
- Pobyt osoby chorej/ podejrzanej o zachorowanie w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
- Wykonywanie czynności zabezpieczających w obszarze strefy izolacyjnej zorganizowanej w związku z pobytem w niej osoby chorej/ podejrzanej o zachorowanie.

**Podczas wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie wywołane nowym koronawirusem 2019-nCoV należy:**

1. Stosować środki ochrony indywidualnej, tj. maski ochronne na twarz i rękawice jednorazowe.
2. Do dezynfekcji rąk stosować preparaty na bazie alkoholu.
3. Zachować zasady stosowania maseczki ochronnej określone przez producenta (sposób zakładania i zdejmowania, częstotliwość zmiany, utylizacja jako odpad).
4. W sytuacji zaobserwowania u osoby, wobec której wykonuje się czynności służbowe lub osoby deklarującej złe samopoczucie, objawów świadczących o podejrzeniu zakażenia lub zachorowania wywołanego koronawirusem 2019-nCoV, należy osobę taką poddać odosobnieniu i niezwłocznie poinformować o tym fakcie służby medyczne (wezwać zespół ratownictwa medycznego tel. 999 lub 112).
5. Należy powiadomić właściwych miejscowo - Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

## UWAGI!

1. Barierej ochronną stanowią wszystkie zabezpieczenia, które zmniejszają możliwość przeniesienia wirusów na większą odległość, ograniczają kontakt drobnoustrojów z błonami śluzowymi człowieka (np. szyba ochronna, maska ochronna typu FFP3, rękawice jednorazowe).
2. W przypadku wątpliwości dotyczących rodzaju zastosowania odzieży ochronnej w określonej sytuacji epidemiologicznej, należy się skonsultować z właściwym miejscowo Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.
3. Wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy a także inne osoby pozostające w kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą z powodu infekcji wywołanej ww. drobnoustrojem powinny stosować maski wyposażone w filtr Hepa FFP3, szczelnie przylegające do twarzy.
4. Maseczkę raz założoną po jej zdjęciu z twarzy, należy wrzucić do pojemnika z czerwonym workiem na odpady niebezpieczne i poddać utylizacji.
5. Maska zawilgocona musi być wymieniona na nową.
6. Maski ochronne nie powinny być stosowane dłużej niż 6 godzin.
7. Osoby z krótkotrwałej styczności z osobą chorą powinny zostać objęte nadzorem epidemiologicznym (mierzenie temp. ciała, obserwacja w kierunku objawów nieżyty dróg oddechowych przez okres 14 dni). Nadzór ten powinien być stosowany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA w odniesieniu do funkcjonariuszy

i pracowników resortu SWiA oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w odniesieniu do pozostałych osób z kontaktu z osobą chorą.

8. Przedmioty i powierzchnie, z którymi stykała się osoba chora należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować preparatami o działaniu wirusobójczym.

### **ZALECENIA DLA FUNKCJOANRIUSZY BIORĄCYCH UDZIAŁ W MISJACH ZAGRANICZNYCH W REJONIE ZAGROŻENIA WIRUSEM 2019-nCoV**

1. Przed planowanym wyjazdem należy zapoznać się informacją dotyczącą bieżącej sytuacji epidemiologicznej <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> i/lub skontaktować się z właściwym miejscowo Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.
2. Według danych ECDC u obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających prowincję Hubei w Chinach istnieje wysokie prawdopodobieństwo zarażenia się ww. wirusem.
3. Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest umiarkowane z tendencją wzrostową.
4. Zalecenia ECDC dla osób podróżujących po Chinach:
  - unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  - bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  - unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta,
  - unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydaliniami lub odchodami,
  - ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem oraz dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  - przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach (najlepiej żywność poddaną obróbce termicznej), pić wodę konfekcjonowaną.
5. Ze względu na występującą wysoką zachorowalność z powodu grypy sezonowej w Chinach, wcześniej niezaszczepieni funkcjonariusze, co najmniej dwa tygodnie przed podróżą powinni poddać się szczepieniu przeciw grypie.
6. Należy przekazać do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA listę uczestników misji, którzy wyjeżdżają i powracają do kraju (wraz z danymi teleadresowymi).

**Informację o kontakcie funkcjonariusza/ pracownika resortu SWiA z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie, należy niezwłocznie przekazać do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA.**

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
  
Marek ROSOBKIEWICZ